

方機目錄

桂枝湯	一	澤瀉湯	九
桂枝附子湯	四	五苓散	〇
桂枝芍藥甘草附子湯	五	猪苓湯	〇
小建中湯	五	牡蠣澤瀉散	一
桂枝甘草附子湯	六	八味丸	一
桂枝人參湯	六	麻黃湯	二
人參湯	六	麻黃附子甘草湯	二
茯苓杏仁甘草湯	七	麻黃附子細辛湯	三
苓桂朮甘湯	七	麻黃杏仁甘草石膏湯	三
苓姜朮甘湯	七	麻黃杏仁薤白甘草湯	三
苓桂五味甘草湯	八	牡蠣湯	四
苓甘五味辛夏湯	八	小青龍湯	四
苓甘五味辛夏仁湯	八	大青龍湯	四
苓甘姜味辛夏仁黃湯	八	越婢湯	五
苓桂甘棗湯	九	葛根湯	六
茯苓澤瀉湯	九	葛根黃芩黃連湯	七
		小柴胡湯	七

柴胡姜桂湯	一九	芍藥甘草湯	二八
大柴胡湯	二〇	甘遂半夏湯	二八
白虎湯	二〇	芍藥甘草附子湯	二九
小承氣湯	二一	甘麥大棗湯	二九
厚朴三物湯	二二	生薑甘草湯	二九
厚朴七物湯	二二	甘草乾姜湯	二九
大承氣湯	二三	四逆湯	三〇
瀉心湯	二三	茯苓四逆湯	三一
大黃附子湯	二四	乾姜附子湯	三一
大黃甘遂湯	二四	附子粳米湯	三一
抵當湯	二五	薤白附子散	三一
橘皮大黃朴消湯	二五	大烏頭煎	三二
大黃消石湯	二五	烏頭湯	三二
大黃牡丹皮湯	二六	赤丸	三三
大黃甘草湯	二六	真武湯	三三
調胃承氣湯	二六	附子湯	三四
桃核承氣湯	二七	天雄散	三四
甘草湯	二七	梔子鼓湯	三四
桂枝湯	二八	茵陳蒿湯	三五

梔子蘗皮湯	三六
梔子厚朴湯	三六
梔子乾姜湯	三六
大陷胸湯	三七
小陷胸湯	三七
栝蘗薤白白酒湯	三八
瓜蒂散	三八
大半夏湯	三九
小半夏湯	三九
半夏苦酒湯	三九
半夏厚朴湯	四〇
半夏乾姜散	四〇
乾姜人參半夏丸	四〇
半夏瀉心湯	四一
吳茱萸湯	四一
厚朴生薑半夏甘草人參湯	四二
黃連湯	四二
乾姜黃連黃芩人參湯	四三
大建中湯	四三

黃連阿膠湯	四三
黃芩湯	四四
大物黃芩湯	四四
三物黃芩湯	四四
白頭翁湯	四五
木防己湯	四五
防己茯苓湯	四六
防己黃耆湯	四六
枳實芍藥散	四七
枳朮湯	四七
排膿散	四七
桂枝枳實生薑湯	四七
枳實薤白桂枝湯	四八
橘皮枳實生薑湯	四八
茯苓飲	四八
橘皮竹茹湯	四九
橘皮湯	四九
桂枝茯苓丸	四九
芎歸膠艾湯	五〇

旋覆花代赭石湯	五〇
赤石脂禹餘糧湯	五一
桃花湯	五一
酸棗仁湯	五一
葶藶大棗湯	五一
十棗湯	五一
桔梗白散	五二

走馬湯	五三
備急圓	五三
礬石湯	五四
消礬散	五四
蛇床子散	五四
黃土湯	五五
桂枝芍藥知母湯	五五

方機

吉益東洞先生口授

乾省守業筆記

殿經文緯校訂

桂枝湯

桂枝、芍藥、生薑各三兩、大棗十二枚（今用各七分五厘）、甘草二兩
（今用五分）

右五味，以水七升，微火煮取三升，去滓，適寒溫，服一升。今以水一合四勺，煮取六勺。

服已須臾，歔熱稀粥一升餘，以助藥力。溫覆令一時許，遍身絳絳，微似有汗者益佳。不可令如水淋漓。病必不除。若一服汗出病差，停後服，不必盡劑。若不汗，更服依前法。又不汗，後服小促其間，半日許令三服盡。若病重者，一日一夜服，周時觀之。服一劑盡，病症猶在者，更作服。若汗不出者，乃服至二三劑。

頭痛發熱，汗出惡風者，正證也。頭痛一證，亦當投此方矣。若因咳嗽，嘔逆而頭痛者，則非此湯之所治也。

惡寒、鼻鳴、乾嘔者，外邪之候也。此方主之。脈浮弱，或浮數而惡寒者，雖不具證，亦用此方。浮數浮弱，蓋桂枝湯之脈狀也。

汗吐下後更湊一證。又發熱汗出而身疼痛者。此方猶爲可用。若脈浮緊而疼痛者。則非此湯之所治也。

發汗後疼痛甚。脈沉遲。或痹或四肢拘攣。心下痞塞者。桂枝加芍藥生

姜人參湯主之。於本方內加芍藥生薑各一兩。人參三兩。今用桂枝大棗人參各六分。芍藥

生薑各八分。甘草四分。以上六味。煮如桂枝湯。兼用大棗或應鍾上衝甚者。桂枝加桂湯主之。於桂枝湯方內

加桂二兩。桂枝一錢。芍藥大棗生薑各六分。甘草四分。右五味。煮如桂枝湯。兼用應鍾若有拘急顫滿之證者。則桂

枝湯不宜與焉。凡上衝者非上逆之謂。氣從少腹上衝于胸是也。

煩脈浮數無顫滿狀者。

腹滿寒下脈浮。或惡寒。或腹時痛者。桂枝加芍藥湯主之。於本方內加

芍藥三兩。桂枝大棗生薑各六分。芍藥一錢二分。甘草四分。右五味。煮如本方。

寒下已止而大實痛者。桂枝加芍藥大黃湯主之。於前方內加大黃一

兩。今於前方內加大黃二分。兼用應鍾散

項背強。汗出惡風者。桂枝加葛根湯主之。於本方內加葛根四兩。桂枝芍藥大棗生薑各六分。葛根

生薑各六分。甘草四分。葛根八分。右六味。煮如本方。

身體強脈沉遲者。發熱汗出四肢拘急者。或桂枝湯證而渴者。括蕞桂

枝湯主之。於本方內加括蕞根二兩。桂枝芍藥大棗生薑各六分。括蕞根甘草各四分。右六味。煮如本方。

黃汗四肢弛痛或身疼重煩燥小便不利者。煩燥小便不利者立方也。身體疼重爲主證也。或盜汗

出者。發熱惡風而發黃色者。桂枝加黃耆湯主之。於本方內加黃耆二

兩。桂枝芍藥大棗生薑各六分。甘草黃耆各四分。右六味。煮如本方。

發汗遂漏不止。其人惡風小便難。四肢發急。難以屈伸者。桂枝加附子

湯主之。於本方內加附子一枚。桂枝芍藥大棗生薑各六分。甘草四分。附子二分。右六味。煮如本方。

胸滿無拘急之證者。桂枝去芍藥湯主之。於本方內去芍藥。桂枝大棗生薑各九分。甘草六分。以上四味。煮法如本方。

若有喘而胸滿或痛或脇下痞硬等證者。非此湯之所知

也。喘家桂枝加厚朴杏子湯主之。於本方內加厚朴二兩。杏子五十個。

桂枝芍藥大棗生薑各六分。甘草厚朴杏仁各四分。右七味。煮如本方。若喘而身疼痛者。非此湯之所主也。

胸中熱而吐涎沫或咳者。兼用南星桂枝去芍藥加皂莢湯主之。於本方內

去芍藥加皂莢二枚。桂枝生薑大棗各七分五厘。甘草皂莢各五分。右五味。煮法如本方。若咳而腹中拘攣或咳

逆倚息者。非此湯之所治也。

驚狂。兼用紫圓起臥不安者。或火逆躁。兼用紫圓胸腹動劇者。及瘧疾而有上衝者。

兼用紫圓桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯主之。桂枝生薑蜀漆各二兩。大

棗十二枚。今各四分五厘。牡蠣五兩。九分五厘。龍骨四兩。六分。甘草二兩。三分。

右爲末。以水一斗二升。先煮蜀漆。減二升。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服

一升。今以水二合四勺。煮取七勺。若有胸脇苦滿之症。則別有主治矣。

頭項強痛發熱無汗。心下滿微痛。兼用南星小便不利者。桂枝去桂加朮芍

湯主之。於桂枝湯方內。去桂加芍朮各三兩。芍藥大藥生藥茯苓朮各六分。甘草四分。右六味。煮法如桂枝湯。

失精胸腹有動者。兼用桂枝加龍骨牡蠣湯主之。於本方內加龍骨牡

蠣各三兩。桂枝芍藥大藥生藥龍骨牡蠣各四分五厘。甘草三分。右七味。煮如本方。

外感之證咽痛者。或咽喉中生瘡或腫痛。兼用應續。劇者以梅肉攻之。者。桂枝加桔梗

湯主之。於本方內加桔梗八分。煮法如本方。濕家骨節疼痛。兼用應續七實。者。或半身不遂口眼喎斜。南

或兼者。或頭疼重。應續者。或身體麻痺者。或頭痛劇者。應續時以七實。或國之藥攻之。桂枝加

朮附湯主之。桂枝芍藥大藥生藥朮各六分。附子甘草各四分。右七味。煮如本方。

濕家眼目不明者。應續或紫或耳聾或肉瞤筋惕者。桂枝加芍朮附湯主

之。於前方內加芍藥六分。經按以上二方皆從桂枝去桂加朮芍藥變來者也。驗之奏効甚多。

桂枝附子湯。

桂枝四兩（今八分）附子三枚（九分）甘草二兩（四分）生薑三兩大

棗十二枚（各六分）

右五味以水六升。煮取二升。去滓。分溫三服。今以水一合八勺。煮取六勺。

身體疼煩不能自轉側者。應續或七實若其人大便秘結。小便自利無衝逆者。

桂枝附子去桂加朮湯主之。於桂枝附子湯方內。去桂加朮四兩。附子九分。朮

八分。甘草四分。大藥生藥各六分。右五味。煮法如桂枝附子湯。

右五味以水三升。煮取一升。去滓。分溫三服。一服覺身痺。半日許再服。三服都盡。其人如冒狀。勿怪。卽是朮附走皮中逐水氣未得除故耳。
桂姜棗草黃辛附湯。

桂枝生薑各三兩。大棗十二枚（各六分）。甘草麻黃細辛各二兩（各四分）。附子一枚（三分）。

右七味以水七升。煮麻黃去上沫。內諸藥。煮取二升。分溫三服。當汗出如蟲行皮中。卽愈。以水一合四勺。煮取六勺。

惡寒或身體不仁。或手足逆冷。而心下堅者。紫圓。南呂。及有痰飲之變者。四肢情痛。惡寒甚者。

世俗所謂勞咳。有骨之灸。骨蒸惡熱惡寒。心中鬱鬱。或心下痞堅者。南呂。無痞堅者。解暑散。俱以紫圓時時攻之。

小建中湯。

桂枝甘草生薑各三兩。大棗十二枚（各四分五厘）。芍藥六兩（九分）。膠飴一升（二錢）。

右六味以水七升。煮取三升。去滓。內膠飴。更上微火。消解。溫服一升。日三服。以水一合五勺。煮取六勺。去滓。內膠飴。令消。腹中急痛。或拘攣者。此其正證也。若有外閉之證。則非此湯之所主治也。

衄解失精下血鍾之人。腹中攣急或痛。手足煩熱者。

產婦手足煩熱。咽乾口燥。腹中拘攣者。鍾若有塊者。則

心悸或肉瞤筋惕。或頭眩者。鍾心悸甚者。解扶苓建中湯主之。於本方內加扶苓四分五

厘。煮法如本方。

盜汗。或汗出多。或身重或不仁者。黃耆建中湯主之。兼用應諸於小建中湯

方內加黃耆一兩半。（今二分三厘）

桂枝甘草附子湯。

甘草、朮各二兩（六分）。附子二枚（九分）。桂枝四兩（一錢二分）。

右四味。以水六升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。初服得微汗。則解。

能食汗出。復煩者。服五合。恐一升多者。服六七合。以水一合二勺。煮取六勺。服。

骨節煩疼。攣痛。不得屈伸。近之則痛劇者。紫圓或七寶

桂枝人參湯。

桂枝、甘草各四兩（八分）。朮、人參、乾姜各三兩（六分）。

右五味。以水九升。先煮四味。取五升。內桂。更煮取二升。溫服一升。日再

夜一服。以水一合八勺。煮取六勺。服。

表裏有熱。下利。心下痞鞭大者。痢病發熱惡寒。心下痞鞭。紫者。

人參湯。

人參、甘草、朮、乾姜各三兩（各七分五厘）

右四味搗篩爲末，蜜和丸如雞黃大，以沸湯數合和一丸研碎，溫服之，日三服，夜二服，腹中未熟，益至三四丸，然不及湯，湯法以四物依兩數切，用水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。以水一合六勺，煮取六勺，服。

心下痞鞭

大者

者，心下痞，喜睡，不了了者，南

暑病

所謂霍亂

嘔吐下利，心下痞鞭者，紫

扶苓杏人甘草湯。

扶苓三兩（一錢五分），杏人五十個（一錢），甘草一兩（五分）。

右三味以水一斗，煮取五升，溫服一升，日三服，不差者更服。以水一合二勺，煮取六勺。

短氣息迫，或喘急，紫者，酒客最多此病，以此湯大有効。

苓桂朮甘湯。

扶苓四兩（一錢二分），桂枝三兩（九分），朮、甘草各二兩（各六分）。

右四味以水六升，煮取三升，去滓，分溫三服。以水一合二勺，煮取六勺。

心下逆滿，起則頭眩，應鍾或紫圓者，

眼痛生赤脈，不能開者，應鍾或紫圓。

耳聾衝逆甚，頭眩者，應鍾及七寶。

苓姜朮甘湯。

甘草、朮各二兩（五分），乾姜、茯苓各四兩（一錢）

右四味，以水五升，煮取三升，分溫三服。以水一合二勺，煮取六勺。

身體重、腰冷、小便自利者。應

苓桂五味甘草湯。

茯苓、桂枝各四兩（八分），甘草三兩（六分），五味子半升（一錢二分）。

右四味，以水八升，煮取三升，去滓，分溫三服。以水一合六勺，煮取六勺。

咳後衝逆劇，手足厥冷，或心下悸，或頭眩，或肉瞤筋惕者。以上諸症皆兼用南呂丸。若

衝逆已愈，但咳滿者，苓甘五味姜辛湯主之。於前方內去桂，加茯苓四

兩（六分），乾姜、細辛各三兩（四分五厘）。

苓甘姜味辛夏湯。

茯苓四兩（九分），甘草、細辛、乾姜各三兩（各三分），五味子半升（九分）。

升（各九分）。

右六味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服半升，日三服。以水一合六勺，煮取六勺。

前方證而嘔者。

苓甘姜味辛夏仁湯。於前方內加杏仁半升（九分）。

前方證而微浮腫。南呂丸者。

苓甘姜味辛夏仁黃湯。於前方內加大黃三兩（三分）。

前方證而大便不通者。

苓桂甘棗湯。

茯苓半斤（一錢二分）甘草三兩（四分五厘）大棗十五枚（五分五厘）桂枝四兩（六分）。

右四味以水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升。

日三服。

以水二合煮取六分。

臍下悸者。

奔豚迫于心胸短氣息迫紫者。

茯苓澤瀉湯。

茯苓半斤（一錢二分）澤瀉生薑各四兩（各六分）甘草桂枝各二兩（各三分）朮三兩（四分五厘）。

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉更煮取二升半溫服八合日三服。

以水二合五勺先煮五味取八勺內澤瀉更煮取六勺。

吐而渴欲飲水者此正症也。紫渴有水而渴也。而小便不利心下悸或腹脹滿

水滿者發實紫圓仲呂也。

之類選用。

澤瀉湯。

澤瀉五兩（二錢五分）朮二兩（一錢）。

右二味以水二升煮取一升分溫再服。

以水一合二勺煮取六勺。

心下有水氣苦胃眩小便不利者。

五苓散。

澤瀉一兩六銖半（八分）猪苓茯苓朮各十八銖（各六分）桂枝半兩

（四分）

右五味爲末以白飲和服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈。

或以水一合五勺煮取六勺。

服亦可也。

大汗出而煩燥小便不利身熱消渴者正症也發汗而脈浮數煩渴者

亦可用焉。

發熱而煩渴欲飲水水入口則吐者。

發熱小便數與發汗同意。

者或渴欲飲

水者。

頭痛發熱汗出惡寒身疼痛而欲飲水者。

發熱嘔吐下利渴而欲飲水者。

發熱

心下悸吐涎沫頭眩者。

發熱

心下痞煩渴口燥小便不利者。

若發黃色者茵陳五苓散主之。

兼用承氣

茵陳蒿末十分五苓散五分右二物和先食飲方寸匕日三服。

猪苓湯。

猪苓、茯苓、阿膠、滑石、澤瀉各一兩（六分）。

右五味以水四升。先煮四味。取二升。去滓。內下阿膠。烱消。溫服七合。日

三服。

以水一合二勺。煮取六勺。內膠令消。

脈浮發熱。渴欲飲水者。此其正症也。

下利。咳嘔。渴而心煩不得眠者。

小便淋瀝。或便膿血。

便者小者。滑石鑿甘便也。數或應鑿。

牡蠣澤瀉散

牡蠣、澤瀉、括蕪根、蜀漆、葶藶、商陸根、海藻（各等分）。

右七味異搗。下篩爲散。更入臼中治之。白飲和。服方寸匕。小便利止。後

服日三服。

胸腹有動而渴。腰以下水腫者。

鑿

八味丸

乾地黄八兩。山茱萸、薯蕷各四兩。澤瀉、茯苓、牡丹皮各三兩。桂枝、附子

各二兩。

右八味末之。煉蜜和丸。梧子大。酒下十五丸。日再服。

脚氣疼痛。少腹不仁。

鑿足冷或痛。少腹拘急。小便不利者。

消渴而小便反多者。

煩熱不得臥。倚息。小便不利。飲食如故者。

夜尿或遺尿者。應鑪。及臍下氣痛之邊。日灸七壯。

麻黃湯。

麻黃三兩。杏仁七十個(各九分)。桂枝二兩(六分)。甘草一兩(三分)。

右四味。以水九升。先煮麻黃。減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升半。去滓。

溫服八合。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息。以水二合。煮取六分。

頭痛發熱身疼。腰痛。骨節疼痛。惡風無汗而喘者。是其正證也。

喘而胸滿者。服發汗劑而不汗却臥者。

濕家身煩疼者。麻黃加朮湯。兼用。主之。於本方內加朮四兩。麻黃杏仁各七分。桂枝五分。

甘草二分半。朮一錢。右五味。煮法如本方。

小瘡內攻。喘鳴息迫。小便不利。一身滿腫者。麻黃加朮附湯主之。兼用。花散或

紫。

麻黃附子甘草湯。

麻黃。甘草各二兩(一錢)。附子一枚(七分五厘)。

右三味。以水七升。先煮麻黃。一兩沸。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫

服一升。日三服。以水一合四勺。煮取六勺。

脈微細。但欲寐。惡寒。黃連解毒散。者。水腫脈沉微鬱滯者。以桃花散或桃實。時時以紫圓攻之而可也。

麻黃附子細辛湯。

麻黃細辛各二兩（一錢）附子一枚（七分五厘）

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫

服一升日三服。以水一合四勺煎取六勺。

手足冷發熱脈沉者或脈微細而惡寒甚者。

麻黃杏仁甘草石膏湯。

麻黃四兩（八分）杏仁五十個甘草二兩（各四分）石膏半斤（一錢六分）

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫

服一升。以水一合四勺煎取六勺。

汗出而喘熱伏者。

喘息而渴者。兼用南呂或姑洗。

麻黃杏仁薤白甘草湯。方從外臺古今錄驗。

麻黃四兩（八分）甘草二兩杏仁五十個（各四分）薤白半斤（一錢六分）

右四味以水五升煮取二升分溫再服。以水一合五勺煎取六勺。

一身悉痛。隨發熱劇或浮腫花者。

發熱皮膚枯燥喘滿花桃者。

牡蠣湯。

牡蠣麻黃各四兩（一錢）甘草二兩（五分）蜀漆三兩（七分五厘）

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服。以水二合四勺先煮麻黃蜀漆得瘧疾惡寒甚胸腹動一合八勺內一味煮取六勺。

劇紫者。

小青龍湯。

麻黃芍藥乾姜甘草桂枝細辛各三兩（各三分）五味子半夏各半升（各六分）

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫

服一升。以水二合煮取六勺。

乾嘔發熱而咳或咳且微喘者。以上兼喘息者。南呂或姑洗或大灸。咳唾吐涎沫者。南呂。

或時時以紫圓攻之。

大青龍湯。

麻黃六兩（八分）桂枝甘草各二兩杏仁四十個（各三分）生薑三兩

大棗十二枚（各四分五厘）石膏雞子大（一錢二分）

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫

服一升。取微似汗。以水一合八勺。煮取六勺。汗出多者。溫粉粉之。一服汗者。停後服。汗多亡陽。遂虛。惡風煩躁不得眠也。

發熱惡寒。身疼痛。不汗出。煩躁者。

脈浮緩。發熱身重。乍有輕時者。

頭痛劇。四肢情痛。發熱而汗不出者。

越婢湯。

麻黃六兩（九分）。石膏半斤（一錢二分）。生薑三兩（四分五厘）。大棗十五枚（六分）。甘草二兩（三分）。

右五味。以水六升。先煮麻黃。去上沫。內諸藥。煮取三升。分溫三服。以水一合二勺。煮取六勺。

一身悉腫。脈浮自汗出。惡風者。

若前症而小便不利者。或一身面目黃腫。小便自利。其脈沉而渴者。或小便不利。不渴者。越婢加朮湯。仲臣。或發實。迫于胸中。則以紫圓攻之。主之。於本方內加朮四

兩。麻黃六分。石膏八分。大棗各四分。甘草二分。生薑三分。右六味。煮法如越婢湯。

脚氣一身腫滿。小便不利。或惡寒。或兩脚不仁者。越婢加朮附湯主之。

兼用紫圓於前方內加附子（四分）。

咳而上氣喘或嘔者。越婢加半夏湯。南主之。於本方內加半夏半升。麻黃

各六分。石膏八分。生薑三分。大棗四分。甘草二分。右六味。煮如本方。

葛根湯

葛根四兩（六分）。麻黃、生薑各三兩。大棗十二枚（各四分五厘）。桂枝、芍藥、甘草各二兩（各二分）。

右七味。以水一斗。先煮麻黃、葛根減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法。將息及禁忌。以水

二合。煮取六分。

項背強而無汗惡寒者。隨鐘

二陽太陽陽明合病下利者。

不下利但嘔者。葛根加半夏湯主之。於本方內。加半夏半升。葛根半夏各六分。桂枝芍藥

甘草各三分。麻黃大棗生薑各四分五厘。右八味。煮如本方。

瘧病無汗。小便反少。氣上衝于胸。口噤不能語言者。本方主之。紫圓

痘瘡自初熱至點見。投本方。兼用紫圓下之一度。自起脹至貫臍。葛根加桔梗湯主之。

於本方內。加桔梗五分。自落痂以後。葛根加大黃湯主之。於本方內加大黃五分。若惡寒劇。起脹甚。而一身腫脹。或疼痛者。葛根加朮附湯。紫圓

主之。於本方內。加朮附子各四分。若腫脹甚者。桃花散寒戰咬牙而下利

者。俱加朮附湯。兼用紫圓。

頭瘡加大黃湯主之。

小瘡葛根加梓葉湯

桃花散以葶麻子搗之。毒劇者以梅肉攻之。

主之於本方內加梓葉五分。

諸項腫惡腫加朮附湯主之。

瘰癧

七寶。梅肉日投。亦可也。

便毒瘍疔之類。

以梅肉攻之。伯州散。朝五分。夕五分。頓送下。

疔瘡

七寶或梅肉之類選用。

凡諸有膿則加桔梗。若疼劇則加朮附。

世俗所謂小兒赤遊風丹毒類。皆加朮附湯主之。

兼用紫圓攻之。

葛根黃芩黃連湯。

葛根半斤（一錢六分）甘草黃芩各二兩（各四分）黃連三兩（六分）

右四味以水八升。先煮葛根減二升。內諸藥。煮取一升。去滓。分溫再服。

以水二合六勺。煮取六勺。

下利喘而汗出者。

項背強。汗出下利者。

以上兼用。唐鑑。

小柴胡湯。

柴胡半斤（八分）黃芩人參甘草生薑各三兩。大棗十二枚（各三分）

半夏半升（六分）

右七味以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。

以水二合四勺煮。取一合二勺。去滓。再煎。取六勺。

往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔者。

胸滿脇痛者。

身熱惡風。頸項強。胸下滿。或渴或微嘔者。

胸下逆滿鬱鬱不欲飲食或嘔者。通

發潮熱胸脇滿而嘔者。塊

寒熱發作有時。胸脇苦滿。有經水之變者。通

產婦四肢苦煩熱。頭痛胸脇滿者。散

產婦鬱冒。寒熱往來。嘔而不能食。大便堅或盜汗出者。塊

發熱大便溏。小便自可。胸滿者。塊

發黃色。腹痛而嘔。或胸脇滿而渴者。通

胸下鞭滿不大便而嘔者。塊

若潮熱不去。大便不通者。柴胡加芒消湯主之。於小柴胡湯方內加芒

硝六兩。柴胡八分。半夏倍各六分。人參黃芩甘草生薑大棗各三分。右八味。以水二

瘧病往來寒熱。胸脇苦滿。或渴不嘔者。柴胡去半夏加枳實湯主之。用

於小柴胡湯方內去半夏。加枳實根四兩。柴胡八分。人參黃芩生薑大棗甘草

法如小柴胡湯。

若上逆者。柴胡加桂枝湯主之。於本方內加桂枝五分。

發熱微惡寒。肢節煩疼。微嘔。心下支結者。兼用或腹中急痛上衝心者。兼用

桂枝湯合方主之。柴胡桂枝湯方。桂枝芍藥黃芩人參生薑大棗各三

分。甘草二分。半夏六分。柴胡八分。

右九味。煮法如小柴胡湯。

若本方證而嘔逆劇者。倍半夏。湯熱而加生薑汁一錢。

本方症而胸腹有動者。失精者。俱應胸滿煩驚者。解毒散柴胡加龍骨牡

蠣湯主之。半夏二合（四分）。大棗六枚。生薑人參龍骨。鉛丹。桂枝。茯苓。

牡蠣各一兩半（各二分三厘）。柴胡四兩（六分五厘）。大黃二兩（二分）。

右十一味。以水八升。煮取四升。內大黃。切如菰子。更煮一二沸。去滓。溫

服一升。以水一合五勺。煮取六勺。

柴胡姜桂湯。

柴胡半斤（八分）。桂枝乾姜黃芩牡蠣各三兩（二分）。括蕤根四兩

（四分）。甘草二兩（二分）。

右七味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。

初服微煩。復服汗出便愈。今煮如小柴胡湯。

胸脇滿。微結。渴而不嘔。頭汗出。往來寒熱。心煩者。兼用

胸脇滿。上逆。胸腹有動者。

瘧疾。惡寒甚。胸脇滿。胸腹有動而渴者。治其成應。

大柴胡湯。

柴胡半斤（八兩）黃芩、芍藥各三兩。大棗十二枚（各三分）半夏半升

（六分）生薑五兩。枳實四枚（各五分）大黃二兩（一分）

右八味。以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。溫服一升。日三服。煮如小柴胡湯。

嘔吐不止。心下急鬱鬱微煩者。

心下痞鞭而痛。嘔吐下利者。

心下滿痛。大便不通者。

胸脇苦滿。腹拘攣。大便不通者。

白虎湯。

知母六兩（六分）石膏一斤（一錢六分）甘草二兩（二分）粳米六合

（一錢二分）

右四味。以水一斗。煮米熟。湯成。去滓。溫服一升。日三服。以水一合二勺。煮取六勺。

手足厥冷。或惡寒而自汗出。讞語者。

手足厥冷。胸腹熱劇者。

大煩渴。舌上乾燥。欲飲水數升者。

無大熱心煩背微惡寒者。

暑病汗出惡寒身熱而渴者。

胸腹熱劇或渴如狂者。本方內加黃連六分。

本方證而心下痞鞭者。白虎加入參湯主之。於本方內加入參三兩（三分）。

瘧疾身熱骨節疼煩渴欲飲水者。白虎加桂枝湯主之。於本方內加桂枝三兩（三分）。右以水一斗五升。煮取八升。去滓。溫服。兼如本方。以上皆以緊固時時攻之。

小承氣湯。

大黃四兩（一錢二分）。厚朴二兩（六分）。枳實三枚（九分）。

已上三味。以水四升。煮取一升二合。去滓。分溫二服。以水二合。煮取六分。

初服湯當更衣。不爾者盡飲之。若更衣者勿服之。

腹滿大便不通者。

汗多。大便鞭。譫語者。

發潮熱。大便初頭鞭後必瘕者。

微煩。小便數。大便鞭者。

下利譫語者。

大便不通。噦而譫語者。

厚朴三物湯。

厚朴八兩（二錢四分）大黃四兩（一錢二分）枳實五枚（一錢五分）右三味以水一斗二升先煮二味取五升內大黃煮取三升溫服一升以利爲度。煮如小承氣湯。

腹滿心下痛而大便不通者。裏所經驗也。

心下滿痛吐出水者。

厚朴七物湯。

厚朴半斤（八分）甘草大黃各三兩（各二分）大棗十枚（二分五厘）枳實五枚生薑五兩（各五分）桂枝二兩（二分）

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三服。以水一合五勺煮取六勺。

腹滿發熱脈浮數飲食如故者。

腹滿發熱脈浮數而嘔大便不通者。

痢疾手足情痛或發熱脈浮數或嘔者。

大承氣湯。

大黃四兩（六分）厚朴半斤（一錢二分）枳實五枚（七分五厘）芒消三合（九分）

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取一升去滓內芒

消。更上微火一兩沸。分溫再服。得下。餘勿服。以水三升。煮厚朴枳實。減中。去滓。內大黃。煮取六升。內芒消。令消。

發潮熱。大便鞭者。

腹滿難解者。

腹滿脹而喘。兩便不通。一身面目水腫者。

潮熱譫語。大便鞭或有燥屎者。

腹滿痛。大便不通者。

大便不通。煩而腹滿者。

目中不了了。睛不和。大便鞭者。

自利清水。心下痛。口乾燥者。

胸滿口噤。臥不著席。腳攣急咬牙者。

腹中有堅塊。大便不通者。

痘瘡腹大滿。兩便不通。或譫語口乾咽燥者。

痢疾譫語。或腹滿痛而不能食者。

食滯腹急痛。大便不通。或嘔利者。

瀉心湯。

大黃二兩（一錢）黃芩黃連各一兩（各五分）

右三味。以水三升。煮取一升。頓服之。今以藥湯八勺。內藥一二

心下痞。按之濡者。正症也。

心氣不足。吐血衄血者。

心煩。心下痞者。

若惡寒者。附子瀉心湯主之。於瀉心湯方內。加附子一枚。

右四味。切三味。以麻沸湯二升漬之。須臾絞去滓。內附子汁。分溫再服。

大黃一錢。黃芩黃連各五分。附子七分五厘。右四味。以水九勺。先煮附子。取六勺。去滓。內諸藥。煮一二沸。須臾絞去滓。服。

大黃附子湯。

大黃三兩（九分）。附子三枚（一錢三分五厘）。細辛二兩（六分）。

右三味。以水五升。煮取二升。分溫三服。若強人。煮取二升半。分溫三服。

服後如人行四五里。進一服。以水一合五勺。煮取六勺。

胸下偏痛發熱者。

惡寒甚。腹痛大便不通者。

大黃甘遂湯。

大黃四兩（一錢四分）。甘遂、阿膠各二兩（各七分）。

右三味。以水三升。煮取一升。頓服之。其血當下。以水一合八勺。煮取六勺。

小腹滿如數狀。小便微難者。

小腹絞痛堅滿。手不可近者。

抵當湯。

水蛭、蠅蟲各三十個（各十個）桃仁二十個（二分）大黃三兩（一錢）右四味，爲末，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升，不下再服。爲末，以水一合，煮取六分。小腹鞭滿，小便自利，發狂者，喜忘，大便鞭，反易通，色黑者，脈浮數而善饑，大便不通者，經水不利者。

橘皮大黃朴消湯。

橘皮一兩（六分）大黃、朴消各二兩（一錢二分）右三味，以水一大升，煮至小升，頓服，即消。以水一合八分，煮取六分。宿食在心胸之間不化者。

大黃消石湯。

大黃、黃蘗、消石各四兩（八分）梔子十五枚（四分）右四味，以水六升，煮取三升，去滓，內消石，煮取一升，頓服。以水一合二勺，煮三味，取六勺，去滓。內消石，發黃色，腹滿，小便不利者，身熱心煩，大便不通者。

大黃牡丹皮湯。方從千金。

大黃四兩（六分）牡丹皮三兩（四分五厘）桃仁五十個芒消二兩（各二分）瓜子一升（一分五厘）

右五味以水六升煮取一升去滓內芒消再煎沸頓服之有膿當下如無膿當下血。以水三合六勺煮取六勺去滓內芒消令消。

腹癰按之即痛時時發熱自汗出復惡寒者。

腹中有堅塊經水不順者。

腹脹滿如鼓生青筋或腫小便不利者。

小腹有堅塊小便淋瀝者。

大黃甘草湯。

大黃四兩（二錢）甘草一兩（五分）

右二味以水三升煮取一升分溫再服。以水一合八勺煮取六勺。

大便不通急迫者。

食已即吐大便不通者。

調胃承氣湯。

大黃四兩（一錢）甘草二兩（五分）芒消半斤（二錢）

右三味以水三升煮取一升去滓內芒消更上火微煮令沸少少

溫服。以水一合八勺。煮取六勺。去滓。內芒消。令消。

因汗吐下譫語者。

發汗後熱而大便不通者。

服下劑下利不止心煩或譫語者。

吐下之後。心下溫溫欲吐大便溏。腹微滿。鬱鬱微煩者。

吐後腹脹滿者。

桃核承氣湯。

桃仁五十個。桂枝。芒消。甘草各二兩（各五分）。大黃四兩（一錢）。

右五味。以水七升。煮取二升半。去滓。內芒消。更上火微沸。下火。先食。溫

服五合。日三服。當微利。以水一合五勺。煮取六勺。去滓。內芒消。微沸。令消。

小腹急結如狂者。

胞衣不下。氣急息迫者。

產後小腹堅痛。惡露不盡。或不大便。而煩燥或譫語者。

痢病小腹急痛者。

甘草湯。

甘草二兩（二錢）。

右一味。以水三升。煮取一升半。去滓。溫服七合。日二服。以水一合二勺。煮取六勺。

急迫而咽痛者。

桔梗湯。

桔梗一兩（一錢）甘草二兩（五分）

右二味以水三升煮取一升去滓分溫再服。以水一合八勺。煮取六勺。

咽痛者。應鐘

咽中腫不能飲食者。

肺癰。應鐘。伯州或梅肉。初發宜灸。諸腫有膿者。伯州梅肉

芍藥甘草湯。

芍藥甘草各四兩（各一錢四分）

右二味以水三升煮取一升半去滓分溫再服之。以水一合二勺。煮取六勺。

腳攣急者。應鐘紫圓

甘遂半夏湯。

甘遂三枚（二分）半夏十二枚（一錢二分）芍藥五枚甘草指大一枚

（各八分）

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半斤加藥汁煎取一合頓服之。

以水一合六勺。煮取四勺。去滓。以蜜四勺和藥汁。煎取六勺。

下利心下續堅滿者。

下利拘攣而痛不可近者。

芍藥甘草附子湯。

芍藥甘草各三兩（一錢二分）附子一枚（六分）。

已上三味以水五升煮取一升五合去滓分溫服。以水二合煮取六分。

汗後惡寒者。

腳攣急疼者。應鑪紫圓或硃寶。

甘麥大棗湯。

甘草三兩（四分五厘）小麥一升（一錢四分）大棗十枚（四分）。

右三味以水六升煮取三升分溫三服。以水一合六分煮取六分。

心中煩躁悲傷欲哭腹中濡者。紫圓或解毒散兼用。

生薑甘草湯。

生薑五兩（一錢）人參三兩（六分）甘草四兩大棗十五枚（各八分）。

右四味以水七升煮取三升分溫三服。以水一合四分煮取六分。

咳唾涎沫不止咽燥而渴者。呂南。

嘔吐不止心下痞硬而急迫者。紫圓。

甘草乾姜湯。

甘草四兩（一錢）乾姜二兩（五分）。

右咬咀。以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。以水一合二勺。煮取六勺。

吐涎沫。不咳。遺尿。小便數者。南

足厥咽中燥。煩躁嘔逆者。

吐下後厥逆煩躁不可如何者。

四逆湯。

甘草二兩（一錢二分）。乾姜一兩半。附子一枚（各九分）。

右三味。咬咀。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。強人可大附子

一枚。乾姜三兩。以水一合五勺。煮取六勺。

手足厥冷者。

下利清穀者。

腹拘急。四肢厥冷。下利惡寒者。

大汗出。熱不去。拘急。四肢厥冷者。

下利腹脹滿。身體疼痛者。

吐利汗出。發熱惡寒。四肢厥冷。脈微欲絕。或腹痛。或乾嘔。或咽痛者。通

脈四逆湯主之。

甘草二兩（一錢）。附子一枚（一分五厘）。乾姜三兩（一錢六分）。

右三味。以水三升。煮取一升二合。去滓。分溫再服。其脈即出者愈。今煮如本方。

下利惡寒。脈微。手足厥冷。或心下痞硬者。四逆加入人參湯主之。於本方內加入人參一兩。甘草一錢。乾姜附子各七分五厘。人參五分。右煎如本方。

茯苓四逆湯

茯苓六兩（一錢五分）。人參一兩（二分五厘）。甘草二兩（五分）。乾姜一兩半。附子一枚（各二分八厘）。

右五味。以水五升。煮取三升。去滓。溫服七合。日三服。以水一合。煮取六分。

手足厥冷煩躁者。

肉瞤筋惕。手足厥冷者。

心下悸。惡寒。腹拘急。下利者。

乾姜附子湯

乾姜一兩（一錢二分）。附子一枚（一錢八分）。

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。頓服。以水一合八分。煮取六分。

煩躁不得眠。脈沉微者。

附子粳米湯

附子一枚（三分）。半夏半升（一錢二分）。甘草一兩（二分）。大棗十枚（五分）。粳米半升（二錢）。

右五味。以水八升。煮米熟。湯成。去滓。溫服一升。日三服。以水一合六分。煮取六分。

腹中雷鳴切痛。胸脇逆滿嘔吐者。

消塊

惡寒或手足厥冷。腹滿痛嘔吐者。

消塊
紫圓

薤白附子敗醬散。

薤白仁十分。附子二分。敗醬五分。

右三味搗爲末。取方寸匙以水二升煎減半。頓服。小便當下。

以水一合二
勺煎減半。

腸癰其身甲錯。腹皮急。按之濡如腫狀。脈數者。

瘡家身甲錯者。

所謂鵝掌風者。

以上
梅肉

大烏頭煎。

烏頭大者五枚（三錢）。

右以水三升。煮取一升。去滓。內蜜二升。煎令水氣盡。取二升。強人服七

合。弱人五合。不差。明日更服。不可一日再服。

以水九勺。煮取三勺。去
滓。內蜜六勺。煎取六勺。

腹痛。自汗出。手足厥冷。脈沉絃者。

發黃或
紫圓

烏頭湯。

麻黃芍藥黃耆甘草各三兩（六分）。川烏五枚。咬咀。以蜜二升（八勺）。

煎取一升（四勺）。即出烏頭。

右五味。咬咀四味。以水三升。煮取一升。去滓。內蜜煎中。更煎之。服七合。

不知盡服之。

以水二合七勺。煮四味。取九勺。去滓。內蜜煎中。更煎。取六勺。

歷節疼痛不可屈伸者。

脚攣急疼痛不可屈伸者。

脚腫疼痛者。

以上兼用藥寶。時時以藥酒攻之。仲呂亦可也。

腰以下腫疼痛者。

藥寶或仲呂或桃花散。

腹中絞痛拘急不得轉側身重手足厥冷陰縮者。

小腹攣急陰囊偏大者。

藥寶或仲呂。

自汗盜汗出浮腫者。

桃花散。

赤丸。

茯苓四兩半夏四兩一方用桂烏頭二兩細辛一兩。

右四味末之內真朱爲色煉蜜丸如麻子大先食酒飲下二丸日再夜

一服不知稍增之以知爲度。

厥逆惡寒心下悸者。

真武湯。

茯苓芍藥生薑各三兩(各七分五厘)朮二兩(五分)附子一枚(四分)。

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服。

以水一合六勺。煮取六勺。

腹痛。消塊小便不利四肢沉重疼痛下利或咳或嘔者。

心下悸。頭眩。鍾應身瞤動振振欲擗地者。

舌上乾燥。黑胎生。口中有津液。身熱頭眩。手足振振或下利者。圖紫

附子湯。

附子二枚。茯苓。芍藥各三兩（六分）。人參二兩（四分）。朮四兩（八分）。

右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。以水一合六勺。煮取六勺。

脈微細。其背惡寒者。

身體痛。手足冷。骨節痛。脈沈者。鍾應

身體痛。小便不利。臣仲心下悸或痞鞭者。

天雄散。

天雄三兩。當作三枚朮八兩。桂枝六兩。龍骨二兩。

右四味。杵爲散。酒服半錢匙。日三服。不知稍增之。

失精。臍下有動而惡寒。或衝逆。或小便不利者。鍾應

梔子鼓湯。

梔子十四枚（八分）。香豉四合（二錢）。

右二味。以水四升。先煮梔子。得二升半。內豉。煮取一升半。去滓。分爲二

服。溫進一服。得吐者止後服。以水一合六勺。先煮梔子。取一合。去滓。內豉。煮取六勺。

心中懊懣者。

煩熱胸中窒者。

身熱不去。心中結痛者。

下後煩。心下濡者。此煩與桂枝湯發汗後之煩不可混。

若急迫者。梔子甘草豉湯主之。於梔子豉湯方內。加甘草二兩（八分）。

若嘔者。梔子生薑豉湯主之。於梔子豉湯方內。加生薑五兩（二錢）。

若胸滿煩熱者。枳實梔子豉湯主之。枳實三枚（六分）。梔子十四枚（四分）。豉一升（二錢八分）。

右三味。以清漿水七升。空煮取四升。內枳實梔子。煮取二升。下豉。更煮五六沸。去滓。溫分再服。覆取微似汗。以水一合六勺。先煮二味。取八勺。下豉。煮取六勺。

若大便不通。胸脇滿痛者。黃疸心中懊懣。或熱痛者。梔子大黃豉湯主之。梔子十二枚（一分五厘）。大黃一兩（一分五厘）。枳實五枚（七分五厘）。豉一升（二錢八分）。

右四味。以水六升。煮取二升。分溫三服。以水一合八勺。煮取六勺。

茵陳蒿湯。

茵陳蒿六兩（一錢八分）。梔子十四枚。大黃二兩（各六分）。

右三味。以水一斗。先煮茵陳。減六升。內二味。煮取三升。去滓。分溫三服。以水二合。先煮茵陳。取一合二勺。內二味。煮取六勺。服。

小便當利。尿如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

發黃色。小便不利。渴而欲飲水。大便不通者。

發黃色。小便不利。腹微滿者。

寒熱不食。頭眩。心胸不安者。

梔子蘗皮湯。

梔子二十五個（一錢五分）甘草一兩（五分）黃蘗二兩（一錢）

右三味。以水四升。煮取一升半。去滓。分溫再服。以水一合六勺。煮取六勺。

身黃發熱者。

身黃心煩者。解毒散

梔子厚朴湯。

梔子十四枚（六分）厚朴四兩。枳實四枚（各一錢二分）

已上三味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分三服。溫進一服。得吐者止。

後服。以水一合四勺。煮取六勺。

心煩腹滿。起臥不安者。

梔子乾姜湯。

梔子十四枚。乾姜二兩（各一錢二分）

右二味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐者止。後

服。以水一合四勺。

煮取六勺。

身熱不去微煩者。兼用解

毒散。

大陷胸湯。

大黃六兩（九分）芒消一升（三錢）甘遂一錢（一分五厘）

右三味以水六升。先煮大黃取二升。去滓。內芒消。煮一兩沸。內甘遂末。

溫服一升。得快利止後服。以水一合八勺。先煮大黃。取六勺。去

滓。內芒消。令消。內甘遂末。服之。

結胸心下痛。按之石鞭者。

短氣煩躁。心下鞭者。

舌上燥而渴。發潮熱。不大便。自心下至小腹鞭滿而痛不可近者。

譫語煩躁。心下痛。手不可近者。

小陷胸湯。

黃連一兩（四分）半夏半升（二錢四分）栝蒌實大者一個（八分）

右三味以水六升。先煮栝蒌。取三升。去滓。內諸藥。煮取二升。去滓。分溫

三服。以水一合八勺。先煮栝蒌。取

九勺。內二味。煮取六勺。

結胸有痰飲之變者。兼用南星始

洗或紫圓

龜背。腹中無積聚者。兼用

紫圓

病聚于胸中而嘔或吃者。兼

紫圓

胸膈膨脹而發癰者。紫圓

括蕞薤白白酒湯。

括蕞實一枚(六分)薤白半升(二錢四分)白酒七升(二合一勺)。

右三味同煮。取二升。分溫再服。取六勺服。

喘息咳唾胸背痛者。姑洗或白散或紫圓

若心痛徹背不得臥者。及膈噎心痛者。括蕞薤白半夏湯主之。俱兼用姑洗紫圓

括蕞實一枚(六分)薤白三兩(九分)半夏半升(一錢八分)白酒一

斗(二合一)。

右四味同煮。取四升。溫服一升。日三服。煮取六勺。

瓜蒂散。

瓜蒂赤小豆各一分(五分)。

右二味各別搗篩爲散。已合治之。取一錢匙。以香豉一合(二錢四分)用熱湯七合(七勺)煮作稀糜。去滓取汁和散。溫頓服之。不吐者少少加。得快吐乃止。諸亡血虛家不可與瓜蒂散。

胸中痞塞。上衝咽喉。不得息者。

手足厥冷。心中煩滿。饑不能食者。

心中溫溫欲吐。又不能吐。手足厥冷者。

大半夏湯。

半夏二升（二錢四分）人參三兩（三分）白蜜一升（二錢五分）

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮取二升半溫服一升

餘分再服。以水三合四勺煮取六勺。

嘔吐而心下痞硬者。太陰或紫圓

嘔而心下痛者。南呂

小半夏湯。

半夏一升（二錢四分）生薑半斤（一錢六分）

右二味以水七升煮取一升半分溫再服。以水一合八勺煮取六勺。

嘔吐而不渴者。陽明者倍加生薑汁。

若心下痞眩悸者小半夏加茯苓湯主之。兼用俱紫圓半夏一升（一錢八分）

生薑半斤（一錢二分）茯苓三兩（四分五厘）

右三味以水七升煮取一升五合分溫再服。以水二合八勺煮取六勺。

半夏苦酒湯。

半夏十四枚（五分）雞子一枚。去黃

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去滓少

少含嚥之不差更作三劑。

咽中生瘡不能語言者。

咽中腫水穀不下者。

半夏厚朴湯。

半夏一升（一錢二分）厚朴三兩（二分）茯苓四兩（四分）生薑五兩（五分）乾蘇葉二兩（二分）。

右五味以水七升煮取四升分溫四服日三夜一服。以水一合五勺煮取六勺。

咽中如有炙肉者。兼用前法。按千金作胸膈心下堅咽中帖帖如有炙肉吐之不出吞之不下。

若感冒桂枝之證而有痰飲者桂枝湯合方主之。唐所經也。

半夏乾姜散。

半夏乾姜各等分。

右二味杵爲散取方寸匙漿水一升半（一合二勺）煎取七合（六勺）頓服之。

乾嘔不止者。

吐涎沫者。兼用前法。

乾姜人參半夏丸。

乾姜人參各一兩（七分五厘）半夏二兩（一錢五分）。

右三味末之以生薑汁糊爲丸如梧子大飲服十丸日三服。或三味水煎合生薑汁服。

妊娠嘔吐不止者。

心下痞鞭而乾嘔不止者。

半夏瀉心湯。

半夏半升（九分）黃芩乾姜人參甘草各三兩大棗十二枚（各四分五厘）黃連一兩（一分五厘）

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服以水二合。煮

取一合二勺。去滓。再煎。取六勺。

心下痞鞭腹中雷鳴者。

太僕

嘔而腸鳴心下痞鞭者。

太僕

心中煩悸或怒或悲傷者。

案

若下利不止乾嘔心煩者甘草瀉心湯主之。默默欲眠目不得閉起臥不安不欲飲食惡聞食臭者甘草瀉心湯主之。於半夏瀉心湯方內加

甘草一兩（一分五厘）

若乾噦食臭腹中雷鳴下利或嘔吐者生薑瀉心湯主之。半夏瀉心湯方內減乾姜二兩加生薑四兩。半夏九分。甘草人參大棗黃芩各四分五厘。黃連乾姜各一分五厘。生薑六分。右八味。煮如半夏瀉心湯。

吳茱萸湯。

吳茱萸一升（一錢八分）人參三兩大棗十二枚（各四分五厘）生薑

六兩（九分）

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服七合。日三服。以水二合一勺。煮取六勺。

食穀欲嘔者。方意以氣逆為主證。

吐利。吐瀉也。手足厥冷煩躁者。

乾嘔吐涎沫。頭痛者。南呂

嘔而胸滿者。紫圓

脚氣上攻而嘔者。紫圓若水腫而嘔者。非此湯之所知也。

厚朴生薑半夏甘草人參湯。

厚朴生薑各半斤（一錢二分）半夏半斤（九分）人參一兩（一分五厘）甘草二兩（三分）

右五味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。以水二合。煮取六勺。

腹脹滿嘔逆者。兼用消塊

黃連湯。

黃連、甘草、乾姜、桂枝各三兩。大棗十二枚（各四分五厘）人參二兩（三分）半夏半升（九分）

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。溫服一升。日三服。夜二服。以水一合。煮取六勺。

胸中有熱。腹中痛欲嘔吐者。

心煩嘔逆者。以上兼用紫圓

乾姜黃連黃芩人參湯。

乾姜黃連黃芩人參各三兩（六分五厘）。

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服。以水一合八勺。煮取六勺。

下利心煩食入口即吐者。兼用紫圓

下利心下痞鞭乾嘔者。兼用紫圓

大建中湯。

蜀椒二合（六分）乾姜四兩（一錢二分）人參二兩（六分）。

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日飲糜溫覆之。以水一合六勺。煮取八勺。去滓內

膠飴。煮取六勺。

心胸間痛嘔不能食者。

腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近者。兼用紫圓

黃連阿膠湯。

黃連四兩（一錢二分）黃芩一兩（三分）芍藥二兩（六分）雞子黃二枚（一枚三分之一）阿膠三兩（九分）。

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烱盡少冷內雞子黃攪

令相得。溫服七合。日三服。

以水一合半。煮三物。取六勺。去滓。內膠。烱熱少冷。內雞子黃。攪令相得。

心中煩而不能臥者。

胸中有熱。心下痞煩而不能眠者。

黃芩湯。

黃芩三兩。大棗十二枚（各九分）。甘草、芍藥各二兩（六分）。

右四味。以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再。夜一服。

以水二合。煮取六勺。

心下痞自下利者。

口苦咽燥目眩自下利者。

若嘔者。黃芩加半夏湯主之。於本方內。加半夏半升。生薑二兩。

黃芩

大棗生薑各四分五厘。甘草芍藥各三分。半夏九分。右六味。煮如本方。

六物黃芩湯。

黃芩、人參、乾姜各三兩。大棗十二枚（各四分五厘）。桂枝一兩（一分

五厘）。半夏半升（九分）。

右六味。以水七升。煮取三升。分溫三服。

以水一合四勺。煮取四勺。

乾嘔下利。心下痞鞭者。

痢疾。心下痞鞭而嘔不能食者。

兼用紫圓

三物黃芩湯。

黃芩一兩（四分）苦參二兩（八分）乾地黃四兩（一錢六分）

右三味以水六升煮取二升溫服一升多吐下蟲以水一合六勺煮取六勺

四肢煩熱者幾用黃連解毒散

白頭翁湯

白頭翁黃連黃蘗秦皮各三兩（各七分五厘）

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更服一升以水二合六勺煮取六勺

熱利下重者

下利欲飲水者

胸中熱而心煩下利者以上三條用紫圓

若心煩不得眠或煩燥者白頭翁加甘草阿膠湯主之於本方內加甘

草阿膠各二兩

右六味以水七升煮取二升半內膠令消盡分溫三服白頭翁黃連黃蘗秦皮各六分甘草阿膠各

四分右六味以水一合七勺煮取六勺去滓內膠令消盡

木防己湯

木防己三兩（六分）石膏雞子大（一錢六分）桂枝二兩（四分）人參

四兩（八分）

右四味以水六升煮取二升分溫再服以水一合八勺煮取六勺

喘滿心下痞堅者。

腫滿心下鞭滿者。

短氣或逆滿而痛或渴者。以上兼用柴實兩呂。以紫圓攻之。

若喘滿止或不渴。心下悸而痞堅難解者。木防己去石膏加茯苓芒消

湯主之。於木防己湯方內。去石膏。加茯苓四兩。芒消三合。

右五味。以水六升。煮取二升。去滓。內芒消。再微煎。分溫再服。微利則愈。

防己六分。桂枝四分。人參茯苓各八分。芒消一錢二分。右五味。以水一合八勺。煮取六勺。內芒消。令消盡。

防己茯苓湯。

防己黃耆桂枝各三兩（各六分）茯苓六兩（一錢二分）甘草二兩

（四分）

右五味。以水六升。煮取二升。分溫三服。以水一合八勺。煮取六勺。

四肢腫水氣在皮膚中肉瞶筋惕者。桃花散

防己黃耆湯。方從外臺

防己四兩（六分）黃耆五兩（七分五厘）朮生薑各三兩。大棗十四枚

（各四分五厘）甘草二兩（三分）

右六味。以水六升。煮取二升。分溫三服。以水一合八勺。煮取六勺。

水病。脈浮身重汗出惡風者。

水病。小便難。腰以下腫。或及陰難屈伸者。呂仲

枳實芍藥散

枳實芍藥各等分。

右二味。杵爲散。服方寸匙。日三服。並主癰腫。以麥粥下之。

腹痛煩滿者。則

枳朮湯

枳實七枚（二錢一分）朮二兩（六分）

右二味。以水五升。煮取三升。分溫三服。腹中與即當散。以水一合。煮取六分。

心下痞堅。小便不利者。

或心下滿痛。小便不利者。呂仲

排膿散

枳實十六枚（一錢六分）芍藥六分。桔梗二分。

右三味。杵爲散。取雞子黃一枚。以藥散與雞黃相等。揉和。令相得。飲和。

服之日一服。

瘡癰痛而欲膿潰者。梅肉

桂枝枳實生薑湯

桂枝生薑各三兩（九分）枳實五枚（一錢五分）

右三味。以水六升。煮取三升。分溫三服。以水一合二勺。煮取六勺。

心中痞逆滿心痛者。

逆滿吐出水不受水藥者。清境或南臣

枳實薤白桂枝湯。

枳實四枚。厚朴四兩（各八分）。薤白半升（一錢六分）。桂枝一兩（二分）。括蕞實一枚（四分）。

右五味。以水五升。先煮枳實厚朴。取二升。去滓。內諸藥。煮數沸。分溫三

服。以水一合六勺。先煮枳實厚朴。取八勺。去滓。內諸藥。煮取六勺。

心中痞。胸脇滿。脇下逆搶心者。

胸滿心痛或背痛者。南臣或按便丹

膈噎胸膈者。按便或紫圓

橘皮枳實生薑湯。

橘皮一斤（二錢四分）。枳實三兩（四分五厘）。生薑半斤（一錢二分）。

右三味。以水五升。煮取二升。分溫再服。以水一合五勺。煮取六勺。

胸中痞塞逆滿短氣者。

吃逸不止者。

茯苓飲。

茯苓、人參、朮各三兩（六分）、枳實二兩（四分）、橘皮二兩半（五分）、生
姜四兩（八分）。

右六味以水六升，煮取一升八合，分溫三服。如人行八九里進之。以水二
合。煮

取六
勺。胸中有痰飲，滿而不能食者。南

吐出水，心下痞鞭，小便不利者。紫

脚氣小便不利，心下悸逆滿嘔者。飛黃或
紫圓

橘皮竹茹湯

橘皮二斤（三錢二分）、竹茹二升、大棗三十枚、生薑半斤（各九分）、甘
草五兩（五分）、人參一兩（二分）。

右六味以水一斗，煮取三升，溫服一升，日三服。以水一合，
煮取六勺。

胸中痹而吃逆者。

橘皮湯

橘皮四兩（二錢）、生薑半斤（四錢）。

右二味以水七升，煮取三升，溫服一升，下咽即愈。以水一合四勺，
煮取六勺。

乾嘔噦者，手足厥者。

桂枝茯苓丸

桂枝、茯苓、牡丹、桃仁、芍藥各等分。

右五味末之。煉蜜和丸。如兔屎大。每日食前服一丸。不知加至三丸。漏下不止。胎動在臍上者。

婦人衝逆頭眩。或心下悸。或肉瞤筋惕者。則

經水不利。面部或手足腫者。湯或散而服之。則或抵當丸兼用。

病有血症之變。手足煩熱。小便不利者。則

芎歸膠艾湯。

芎藭、阿膠、甘草各二兩（三分）。艾葉、當歸各三兩（四分五厘）。芍藥四兩（六分）。乾地黄六兩（九分）。

右七味。以水五升。清酒五升。合煮取三升。去滓。內膠。令消盡。溫服一升。日三服。不差。更作。以水一合。清酒一合。煮取六勻。去滓。內膠。令消盡。

漏下者。

產後下血不絕者。

下血吐血不止者。解毒散

旋覆花代赭石湯。

旋覆花、甘草各三兩。大棗十二枚（各四分五厘）。人參二兩（三分）。生姜五兩（七分五厘）。半夏半升（九分）。代赭石一兩（一分五厘）。

右件七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。

以水

二合。煮取一合二勺。去滓。再煎。取六勺。

心下痞鞭。噎氣不除者。

赤石脂禹餘糧湯。

赤石脂禹餘糧各一斤（一錢六分）。

已上二味。以水六升。煮取二升。去滓。三服。以水一合八勺。煮取六勺。

下利。小便不利者。

小腹痛。小便不利。若下利者。

桃花湯。

赤石脂一斤（一錢六分）。乾姜一兩（一分）。粳米一升（一錢）。

右三味。以水七升。煮米令熟。去滓。溫七合。內赤石脂末。方寸匙。日三服。

若一服愈。餘勿服。以水二合。煮取六勺。內赤石脂末方寸匙。

下利。便膿血者。

腹痛。小便不利。下利不止者。

酸棗仁湯。

酸棗仁二升（二錢四分）。甘草一兩（一分）。知母茯苓。芎藭各二兩（二分）。

右五味以水八升。煮酸棗仁得六升。內諸藥。煮取三升。分溫三服。以水一合六勺。

煮酸棗。取一合二勺。內諸藥。煮取六勺。

煩而不得眠者。

煩悸而眠不寤者。

葶藶大棗湯。

葶藶搗丸如彈丸大(五分)。大棗十二枚(三分)。

右先以水三升。煮棗取二升。去棗。內葶藶。煮取一升。頓服。以水一合八勺。先煮棗。取一合

二勺。去棗。內葶藶。煮取六勺。

喘而不得臥者。

一身面目浮腫。咳逆上氣。喘鳴息迫者。白散兼用。

十棗湯。

芫花、甘遂、大戟各等分。

右三味等分。各別搗。爲散。以水一升半。先煎大棗肥者十枚。取八合。去

滓。內藥末。強人服一錢匙。羸人服半錢。溫服之。平旦服。若下少病不除

者。明日更服。加半錢。得快下利後。糜粥自養。以水一合二勺。先煮大棗五錢。取六勺。內藥末一錢。頓服之。

頭痛。心下痞硬。引脇下痛。乾嘔汗出者。

欬煩胸中痛者。

胸背掣痛不得息者。

桔梗白散

桔梗、貝母各三分，巴豆一分。

右三味爲散，強人飲服半錢匙，羸者減之。病在膈上者吐膿，而膈下者瀉出。若下多不止，飲冷水一杯則定。

有結毒而濁唾吐膿者，毒在胸咽而不得息者。

走馬湯

巴豆、杏仁各二枚。

右二味以綿纏槌令碎，熱湯二合，捻取白汁，飲之當下。老少量之，通治

飛尸鬼擊病。以熱湯六勺，餘如上法。

中惡心痛，腹脹大便不通者。

喘鳴息迫者。小兒馬脾風之類是也。

所謂中風吼喘息迫者。

備急圓

大黃、巴豆、乾姜各一兩。

右藥各須精新，先搗大黃、乾姜爲末，研巴豆內中，合治一千杵，用爲散。

蜜和丸亦佳。密器中貯之。莫令洩氣。

食滯腹痛者。

心痛諸卒痛者。

霍亂吐下心痛者。

礬石湯。

礬石二兩。

右一味。以漿水一斗五升。煎三五沸。浸腳良。

脚氣痿弱不仁。及上入搶心者。

消礬散。

消石。礬石各等分。

右二味。爲末。以大麥粥汁和。服方寸匙。日三服。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑。是候也。

日晡發熱惡寒。小腹滿身悉黃。額上黑。足下熱。或腹脹如水狀。大便黑。

時瘡者。

蛇床子散。

蛇床子仁。

右一味。末之。以白粉少許和。令相得。如棗大。綿裹內之。自然溫。陰中痒。

者以此湯洗之。眼目痒者亦然。

黃土湯。

甘草、乾地黄、朮、附子、阿膠、黃芩（各四分五厘）、竈中黃土（一錢二分）。

右七味以水八升。煮取三升。溫服。以水一合五勺。煮取六勺。

下血四肢不仁。或冷而痛者。

下血手足煩熱。心煩不得眠者。

吐血衄血。亦有前症。則此湯主之。

桂枝芍藥知母湯。

桂枝、知母、防風（各四分）、芍藥三分、甘草、麻黃各二分、生薑、蒼朮（各五分）、附子（一分五厘）。

右九味以水七升。煮取二升。溫服七合。日三服。以水一合五勺。煮取六勺。歷節疼痛。攣急。頭眩。溫溫欲吐者。